

Touchdown Quattro			
Plodina, indikace	Dávkování	Aplikace	Měsíc(e)
Nezemědělská půda, Nežádoucí dřeviny - Nátěr nebo nástrík 15% roztoku do záseků kmínku.	150 ml / 1 l / 100 m ²	Nátěr	3,4,5,6,7,8,9,10
Orná půda, Plevel vytrvalé - Po sklizni. Orná půda, strniště. Ošetřuje se proti obrůstajícím a nově vzešlým plevelům po sklizni.	40 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	8,9,10
Orná půda, Pýr plazivý - Po sklizni. Orná půda, strniště. Pýr plazivý by měl být ve fázi nejméně 3-4 vyvinutých listů.	30-40 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	8,9,10
Ovocné dřeviny, Plevel - OL=7. Mimo broskvoň. Mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.	30-60 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,5,6,7,8,9,10
Ovocné dřeviny, Plevel jednoleté - OL=7. Mimo broskvoň. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.	20 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,5,6,7,8,9,10

Ovocné dřeviny, Turanka kanadská - OL=7. Mimo broskvoň. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláčci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.	20 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,5,6,7,8,9,10
Réva vinná, Turanka kanadská - OL=7. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláčci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.	20 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,5,6,7,8,9,10
Réva vinná, Plevele - OL=7. Mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy. Vyšší dávku použít proti svláčci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.	30-60 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,5,6,7,8,9,10
Réva vinná, Plevele jednoleté - OL=7. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláčci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.	20 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,5,6,7,8,9,10
Nezemědělská půda, Nežádoucí vegetace - Aplikace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, v areálech podniků, apod.	40-50 ml / 1-2 l / 100 m ²	Postřik, nátěr	3,4,5,6,7,8,9,10

Nezemědělská půda, Plevelé jednoleté - Cesty mezi záhony, komposty.	20-30 ml / 1-3 l / 100 m ²	Postřik, nátěr	3,4,5,6,7,8, 9,10
Nezemědělská půda, Plevelé vytrvalé - Cesty mezi záhony, komposty.	30-50 ml / 1-3 l / 100 m ²	Postřik, nátěr	3,4,5,6,7,8, 9,10
Půda, Plevelé jednoleté - Příprava před výsevem. Výsev po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů.	20-30 ml / 1-2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,9,10
Půda, Plevelé jednoleté - Příprava před výsadbou. Výsadbu po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů.	20-30 ml / 1-2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,9,10
Půda, Plevelé vytrvalé - Příprava před výsadbou. Výsadbu po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů.	30-40 ml / 1-2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,9,10
Půda, Plevelé vytrvalé - Příprava před výsevem. Výsev po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů.	30-40 ml / 1-2 l / 100 m ²	Postřik	3,4,9,10