

Serifel			
Plodina, indikace	Dávkování	Aplikace	Měsíc(e)
Jahoda, Plíseň šedá - OL=1. Pole. Aplikace postřikem od začátku vývoje květenství (před kvetením) až do druhé sklizně. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 5 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7,8
Jahoda, Sklerotiniová hniloba - OL=1. Pole. Aplikace postřikem od začátku vývoje květenství (před kvetením) až do druhé sklizně. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 5 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7,8

Malina, Plíseň šedá - OL=1. Pole. Aplikace postřikem od začátku vývoje květenství (před kvetením) až do konečné zralosti. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 10 l / 100 m²	Postřik	5,6,7,8
Paprika, Plíseň šedá - OL=1. Pole. Aplikace postřikem od začátku tvorby poupat (před kvetením) až do konečné zralosti. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 10 l / 100 m²	Postřik	5,6,7,8

Paprika, Sklerotiniová hniloba - OL=1. Pole. Aplikace postřikem od začátku tvorby poupat (před kvetením) až do konečné zralosti. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 10 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7,8
Rajčata, Plíseň šedá - OL=1. Pole. Aplikace postřikem od začátku tvorby poupat (před kvetením) až do konečné zralosti. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 10 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7,8

Rajčata, Sklerotiniová hniloba - OL=1. Pole. Aplikace postřikem od začátku tvorby poupat (před kvetením) až do konečné zralosti. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 10 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7,8
Réva vinná, Plíseň šedá - OL=3. Aplikace postřikem od konce kvetení do fáze bobule zralé. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. Postřik opakujte max. 10x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 10 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7,8

Salát, Plíseň šedá - OL=1. Pole. Aplikace od vývoje prvních listů až do sklizně. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 5 l / 100 m²	Postřik	5,6,7,8
Salát, Sklerotiniová hniloba - OL=1. Hlízenka. Pole. Aplikace od vývoje prvních listů až do sklizně. Interval mezi aplikacemi je 5 dnů. Postřik opakujte max. 6x za vegetaci. Aplikujte při teplotě nad 15 °C a vysoké vlhkosti. Účinnost závisí na kvalitě postřiku (homogenní pokrytí celých rostlin). Ošetřete dostatečným množstvím postřiku na spodní hranici povolené dávky. Aby byly bakterie účinné, musí pokrýt celou ošetřovanou plochu, než dojde k napadení patogeny. Aplikujte preventivně.	5 g / 5 l / 100 m²	Postřik	5,6,7,8