

KRÁSKA květnatá luční směs osiv - složení

Trávy 70%: Psineček obecný (*Agrostis capillaris* 'Polana') 3%, Psárka luční (*Alopecurus pratensis* 'Zuberská') 1%, Tomka vonná (*Anthoxanthum odoratum*) 3%, Ovsík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius* 'Rožnovský') 1%, Třeslice prostřední (*Briza media*) 1 %, Sveřep vzpřímený (*Bromus erectus*) 5 %, Pohánka hřebenitá (*Cynosurus cristatus* 'Rožnovská') 10 %, Srha laločnatá (*Dactylis glomerata* 'Dana') 1%, Metlice trsnatá (*Deschampsia caespitosa*) 3 %, Kostřava luční (*Festuca pratensis* 'Otava') 6 %, Kostřava červená dlouze výběžkatá (*Festuca rubra rubra* 'Levočská') 10 %, Kostřava červená krátce výběžkatá (*Festuca rubra trichophylla* 'Laroma') 5%, Kostřava drsnolistá (*Festuca trachyphylla* 'Štěpánka') 7 %, Bojínek luční (*Phleum pratense* 'Levočská') 1%, Lipnice hajní (*Poa nemoralis* 'Dekora') 2 %, Lipnice luční (*Poa pratensis* 'Balin') 8 %, Trojštět žlutavý (*Trisetum flavescens* 'Horal') 3%

Byliny 25,3%: Řepík lékařský (*Agrimonia eupatoria*) 0,7%, Řebříček obecný (*Achillea millefolium*) 0,2%, Rmen barvířský (*Anthemis tinctoria*) 1,2 %, Bukvice lékařská (*Betonica officinalis*) 0,7%, Zvonek klubkatý pravý (*Campanula glomerata*) 0,1%, Kmín kořený (*Carum carvi* 'Prochan') 0,5%, Chrpa modrá (*Centaurea cyanus*) 0,5%, Chrpa luční (*Centaurea jacea*) 0,2%, Chrpa čekánek (*Centaurea scabiosa*) 0,1%, Škarda dvouletá (*Crepis biennis*) 0,3 %, Mrkev obecná (*Daucus carota* 'Táborská žlutá') 0,3%, Hvozdík kartouzek (*Dianthus carthusianorum*) 1,3%, Hvozdík kropenatý (*Dianthus deltoides*) 0,8%, Tužebník obecný (*Filipendula vulgaris*) 0,5%, Svízel bílý (*Galium album*) 0,5 %, Svízel syřišťový (*Galium verum*) 0,4%, Třezalka tečkovaná (*Hypericum perforatum*) 0,9 %, Chrastavec rolní (*Knautia arvensis*) 1 %, Máchelka podzimní (*Leontodon autumnalis*) 0,5 %, Máchelka srstnatá (*Leontodon hispidus*) 0,1%, Kopretina irkutská (*Leucanthemum ircutianum*) 4%, Len vytrvalý (*Linum perenne*) 0,3%, Kohoutek luční (*Lychnis flos-cuculi*) 0,8 %, Smolníčka obecná (*Lychnis viscaria*) 0,7%, Sléz pižmový (*Malva moschata*) 0,10 %, Dobromysl obecná (*Origanum vulgare*) 1,9%, Mák vlíčí (*Papaver rhoeas*) 0,1%, Bedrník obecný (*Pimpinella saxifraga*) 0,5 %, Jitrocel kopinatý (*Plantago lanceolata*) 0,2%, Jitrocel prostřední (*Plantago media*) 0,1%, Mochna stříbrná (*Potentilla argentea*) 0,7%, Mochna přímá (*Potentilla recta*) 1,1%, Černohlávek obecný (*Prunella vulgaris*) 1,2%, Šalvěj luční (*Salvia pratensis*) 1,2%, Šalvěj přeslenitá (*Salvia verticillata*) 0,3%, Krvavec menší (*Sanguisorba minor*) 1,3%, Krvavec toten (*Sanguisorba officinalis*) 0,1%, Silenka dvoudomá (*Silene dioica*) 0,4 %, Silenka nadmutá (*Silene vulgaris*) 1,2%,

Jeteloviny 4,7%: Úročník bolhoj (*Anthyllis vulneraria* 'Pamir') 0,6%, Hrachor luční (*Lathyrus pratensis*) 0,2%, Štírovník růžkatý (*Lotus corniculatus* 'Táborák') 0,5%, Tolice dětelová (*Medicago lupulina* 'Ekola') 0,1%, Vičenec ligrus (*Onobrychis viciifolia* 'Višňovský') 1,5%, Jetel luční (*Trifolium pratense* 'Spurt') 0,1%